

Total number of printed pages-15

1 (Sem-1) PHY

2023

PHYSICS

Paper : PHY0100104

(*Mathematical Physics and Mechanics*)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Answer either in English or in Assamese.

1. Answer the following questions : $1 \times 5 = 5$

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(A) Coriolis force on a particle moving in a rotating frame of reference is

- (i) Parallel to the direction of angular velocity of the frame
- (ii) Parallel to the direction of velocity of the particle
- (iii) Perpendicular to the direction of velocity of the particle but parallel to the direction of angular velocity of the frame

Contd.

- (iv) Perpendicular to both the direction of velocity of the particle and the direction of angular velocity of the frame

ঘূর্ণায়মান স্থানাংক পদ্ধতি এটাত গতি করি থকা কণিকা এটাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা কৰিয়োলিছ বল

- (i) স্থানাংক পদ্ধতিৰ কৌণিক বেগৰ দিশৰ সমান্তৰাল
- (ii) কণিকাটোৰ বেগৰ দেশৰ সমান্তৰাল
- (iii) কণিকাটোৰ বেগৰ দিশৰ লম্ব কিন্তু স্থানাংক পদ্ধতিৰ কৌণিক বেগৰ দিশৰ সমান্তৰাল
- (iv) কণিকাটোৰ বেগৰ দিশ আৰু স্থানাংক পদ্ধতিৰ কৌণিক বেগৰ দিশ দুয়োটাৰে লম্ব দিশত

- (B) If L is the angular momentum of a particle of mass m moving under a central force which one of the following is the true expression of areal velocity of the particle ?

- (i) $dA/dt = L/m$
- (ii) $dA/dt = 2L/m$
- (iii) $dA/dt = L/2m$
- (iv) $dA/dt = L/4m$

যদি কেন্দ্ৰীয় বলৰ প্ৰভাৱত গতি কৰি থকা m ভৰৰ কণিকা এটাৰ কৌণিক ভৰবেগ L হয় তেন্তে তলত দিয়া কোনটো ৰাখিয়ে কণিকাটোৰ ক্ষেত্ৰফলীয় বেগ বুজায় ?

- (i) $dA/dt = L/m$
- (ii) $dA/dt = 2L/m$
- (iii) $dA/dt = L/2m$
- (iv) $dA/dt = L/4m$

- (C) If \vec{A} is a vector field which one of the following is the correct expression for it to be an irrotational vector field ?

- (i) $\nabla^2 \vec{A} = 0$
- (ii) $\nabla \times \vec{A} = 0$
- (iii) $\nabla \cdot \vec{A} = 0$
- (iv) $\nabla \vec{A} = 0$

যদি \vec{A} এটা ভেষ্টৰ ক্ষেত্ৰ হয় তেন্তে তলৰ কোনটো সমীকৰণে অ-ঘূর্ণায়মান ভেষ্টৰ ক্ষেত্ৰ বুজাব ?

- (i) $\nabla^2 \vec{A} = 0$
- (ii) $\nabla \times \vec{A} = 0$
- (iii) $\nabla \cdot \vec{A} = 0$
- (iv) $\nabla \vec{A} = 0$

(D) If \vec{A} is a vector and $d\vec{S}$ is an elementary area vector making an angle of 60° with the given vector, which one of the following is the correct representation of vector flux passing through the area?

(i) $|\vec{A}||d\vec{S}|$

(ii) $|\vec{A}||d\vec{S}|\frac{\sqrt{3}}{2}$

(iii) $|\vec{A}||d\vec{S}|\frac{1}{2}$

(iv) 0

$d\vec{S}$ নামৰ সুক্ষ্ম ক্ষেত্ৰফল ভেস্ট্ৰটোৱে \vec{A} ভেস্ট্ৰৰ লগত 60° কোণ কৰি আছে। তলৰ কোনটো ৰাশিয়ে ক্ষেত্ৰফলখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ভেস্ট্ৰ প্ৰবাহ (flux) বুজাব?

(i) $|\vec{A}||d\vec{S}|$

(ii) $|\vec{A}||d\vec{S}|\frac{\sqrt{3}}{2}$

(iii) $|\vec{A}||d\vec{S}|\frac{1}{2}$

(iv) 0

(E) If A is the amplitude of simple harmonic oscillation which of the following is the true relation between total energy E and amplitude A ?

(i) $E \propto A^2$

(ii) $E \propto A^3$

(iii) $E \propto A^{-2}$

(iv) $E \propto A$

যদি সৱল পৰ্যাবৃত্ত দোলনৰ বিস্তাৰ A হয় তেন্তে তলৰ কোনটো সম্পৰ্কই বিস্তাৰ A আৰু মুঠ শক্তিৰ (E) মাজেৰ প্ৰকৃত সম্পৰ্ক নিৰ্দেশ কৰে?

(i) $E \propto A^2$

(ii) $E \propto A^3$

(iii) $E \propto A^{-2}$

(iv) $E \propto A$

2. Answer **any five** questions from the following : $2 \times 5 = 10$

তলৰ ঘিকোনো পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(A) If $\varphi = 3x^2y - y^4z^2$ is a scalar field find $\nabla\varphi$ at the point $(1, 2, 1)$

যদি $\varphi = 3x^2y - y^4z^2$ এটা স্কেলার ফ্রেক্ট্র হয় তেত্তে
(1, 2, 1) বিন্দুত $\nabla\varphi$ র মান নির্ণয় করা।

(B) State the Gauss's divergence theorem.

গাউচ্র অপসরণ (divergence) উপপাদ্যটো লিখা।

(C) From the gradient operator ∇ in spherical polar coordinates obtain divergence operator ∇^2 in spherical polar coordinates.

গোলাকার মেৰ স্থানাংক পদ্ধতিত ∇ অপারেটৰৰ পৰা
 ∇^2 অপারেটৰটো উলিওৱা।

(D) Show that $\bar{F} = (2xy + z^3)\hat{i} + x^2\hat{j} + 3xz^2\hat{k}$
is an irrotational field.

দেখুওৱা যে $\bar{F} = (2xy + z^3)\hat{i} + x^2\hat{j} + 3xz^2\hat{k}$
এখন অবৃণ্গায়মান ভেষ্টৰ ফ্রেক্ট্র।

(E) Is Earth an inertial frame? Justify.

পৃথিবীখন জড় স্থানাংক পদ্ধতি হয়নে? যুক্তি দৰ্শোৱা।

(F) Give the expression for Coriolis acceleration. If a particle falls vertically downward in Earth's gravitational field what will be the direction of deflection due to Coriolis force?

1+1=2

কৰিয়োলিছ ত্বরণৰ বাণিটো লিখা। পৃথিবীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ
ফ্রেক্ট্র কণিকা এটা উলম্ব দিশত তললৈ পৰি আছে।
কৰিয়োলিছ বলে কণিকাটোক কোনটো দিশত গতি কৰাৰ?

(G) Show that angular momentum is conserved for a central force.

দেখুওৱা যে কেন্দ্ৰীয় বলৰ ফ্রেক্ট্র কৌণিক ভৰবেগ
সংৰক্ষিত হয়।

(H) Calculate the reduced mass of a system constituted by a star of mass $2 \times 10^{30} \text{ kg}$ and a planet of mass 10^{24} kg .

2×10^{30} কিঃগ্রাম ভৰৰ তৰা এটা আৰু 10^{24} কিঃগ্রাম
ভৰৰ গ্ৰহ এটাৰে গঠিত সমষ্টিটোৰ লাঘৱ ভৰ (reduced
mass) গণনা কৰা।

(I) Semimajor axis of Mars is $228 \times 10^6 \text{ km}$ and that of Jupiter is $778 \times 10^6 \text{ km}$. Obtain the ratio of their orbital periods while they move around the Sun.

মঙ্গল আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহৰ কক্ষপথৰ অধৰ্মুখ্য অক্ষ হ'ল
ক্ৰমে $228 \times 10^6 \text{ km}$ আৰু $778 \times 10^6 \text{ km}$ । সূৰ্যৰ
চৌদিশে গ্ৰহ দুটাৰ প্ৰদক্ষিণ কালৰ অনুপাত উলিওৱা।

- (J) The displacement of a simple harmonic oscillator as a function of time is given by

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{10}} \cos(400\sqrt{10}t + 50)$$

Obtain its amplitude and time period of oscillation.

$$0.5+1.5=2$$

সরল পর্যাবৃত্ত দোলক এটাৰ সৰণ তলত দিয়া হ'ল।

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{10}} \cos(400\sqrt{10}t + 50)$$

ইয়াৰ বিস্তাৰ আৰু পর্যায়কাল নিৰ্গত কৰা।

3. Answer **any four** questions from the following:

$$5 \times 4 = 20$$

তলৰ যিকোনো চাৰটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (A) The acceleration of a particle at any time t is given by

$$\vec{a} = (12 \cos 2t)\hat{i} - (8 \sin 2t)\hat{j} + (16t)\hat{k}$$

If the velocity of the particle at $t=0$ is zero, obtain the velocity vector at anytime t .

t সময়ত কণিকা এটাৰ সৰণ তলত

$$\vec{a} = (12 \cos 2t)\hat{i} - (8 \sin 2t)\hat{j} + (16t)\hat{k}$$

যদি $t=0$ সময়ত কণিকাটোৰ বেগ শূন্য হয় যিকোনো সময় t ত কণিকাটোৰ বেগ ভেঙ্গে উলিওৱা।

- (B) If gravitational potential energy is written as $V(r) = -k/r$, where k is a constant and $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ show that the negative gradient of $V(r)$ becomes equal to Newton's gravitational force, $\vec{F} = k\vec{r}/r^3$.

যদি মহাকৰ্ষণিক স্থিতি শক্তি $V(r) = -k/r$ হয় য'ত

k এটা ধৰণৰ আৰু $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ নিউটনৰ মহাকৰ্ষণ বল $\vec{F} = k\vec{r}/r^3$ আৰু $-\nabla V(r)$ সমান বুলি দেখুওৱা।

- (C) The line element in Cartesian coordinates is given by

$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$. Obtain the line element in spherical polar coordinates.

কার্টেজীয় স্থানাংক পদ্ধতিত অন্তরালটো

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \text{ বুলি লিখা হয়।}$$

গোলকীয় মেৰু পদ্ধতিত (spherical polar coordinates) অন্তরালটো উলিওৱা।

- (D) Angular velocity of Earth is 2×10^{-7} radian/sec and its radius is 6378 km. Obtain the centrifugal acceleration of a particle located at latitude $\varphi = 60^\circ$. If the angular velocity of Earth is expressed as $\vec{\omega} = \omega \cos \varphi \hat{j} + \omega \sin \varphi \hat{k}$ and velocity of a particle falling downward is $\vec{v} = -v \hat{k}$ obtain the magnitude of Coriolis acceleration at the latitude $\varphi = 60^\circ$. 2+3=5

পৃথিৰীৰ কৌণিক বেগ 2×10^{-7} ৰেডিয়ান/ছেকেণ্ড আৰু ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল 6378 কিঃমিঃ। 60° অক্ষাংশ (latitude) ত অৱস্থিত কণিকা এটাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা অপকেন্দ্ৰিক ত্বরণৰ মান উলিওৱা। যদি পৃথিৰীৰ কৌণিক বেগক $\vec{\omega} = \omega \cos \varphi \hat{j} + \omega \sin \varphi \hat{k}$ আৰু উলমৰ্দিশত অধোমুখী কণিকা এটাৰ বেগক $\vec{v} = -v \hat{k}$ বুলি প্ৰকাশ কৰা হয়, তেন্তে 60° অক্ষাংশত কৰিয়োলিছ ত্বরণৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (E) State work-energy theorem. A conservative force is expressed as $\vec{F} = -\nabla U$, where U is the potential energy. What is the total work done by the force in moving a particle from point A to point B? Use work-energy theorem to prove that total mechanical energy in moving from A to B is conserved.

$$1+2+2=5$$

কাৰ্য-শক্তিৰ উপপাদ্যটো লিখা। যদি U স্থিতিশক্তি হয় তেন্তে সংৰক্ষণশীল বল এটাক $\vec{F} = -\nabla U$ বুলি প্ৰকাশ কৰা হয়। A বিন্দুৰ পৰা B বিন্দুলৈ কণিকা এটা নিৰবলৈ এই বলটোৱে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব? কাৰ্য-শক্তিৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে A ৰ পৰা B বিন্দুলৈ গতি কৰোতে কণিকাটোৰ মুঠ যান্ত্ৰিক শক্তি সংৰক্ষিত হয়।

- (F) Assume that two particles of mass m_1 and m_2 are undergoing inelastic collision. If the velocities of the particles before collision are $u_1 = u$ and $u_2 = 0$ and the two particles stick together after collision, obtain an expression for the velocity of the composite after the collision. Show that there is a loss of kinetic energy of the system.

$$2+3=5$$

- (ii) If r is the magnitude of the position vector \vec{r} obtain $\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$. If electric field is expressed as negative gradient of potential energy $\vec{E} = -\nabla V$, obtain the electric field if the potential energy function is given by $V = -kxy$, where k is a constant.

$$2.5 + 2.5 = 5$$

যদি r স্থানাংক তেক্ষণ \vec{r} র মান হয় তেন্তে

$\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$ র মান নির্ণয় করা। যদি V বিদ্যুৎ বিভর শক্তি হয় তেন্তে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র খনক $\vec{E} = -\nabla V$ বুলি লিখা হয়। যদি $V = -kxy$ হয়, য'ত k এটা ধ্রুক বাস্তি, তেন্তে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা।

- (B) Derive the relation between Young's modulus Y , modulus of rigidity η and bulk modulus K .

ইয়েঙ্গ গুণাংক Y , বিরুপণ গুণাংক, η আৰু আয়তন গুণাংক K র মাজৰ সম্পর্কটো স্থাপন কৰা।

- (C) Obtain gravitational potential outside, on and inside of a spherical shell of mass M and radius R . What is the value of the Gravitational constant? $9+1=10$

M ভৱ আৰু R ব্যাসার্ধৰ গোলাকাৰ খোল (spherical shell) এটাৰ বাহিৰত, পৃষ্ঠাগৰ ওপৰত আৰু অন্তৰ্ভুগত মহাকৰ্ষণিক বিভৱৰ মান উলিওৱা। মহাকৰ্ষণিক ধ্রুকৰ মান কিমান?

- (D) What are the assumptions made by Poiseuille in deriving rate of flow of a liquid through a narrow tube? Derive Poiseuille's equation for rate of flow of a liquid. $3+7=10$

ক্ষীণ নলী এডালৰ মাজেৰে প্ৰাৰ্থিত তৰলৰ প্ৰাৰ্থৰ হাৰ উলিওৱাত পইজিউলীয়ে কি কি অনুমান কৰিবলগীয়া হৈছিল? তৰল পদাৰ্থৰ প্ৰাৰ্থৰ হাৰৰ বাবে পইজিউলীৰ সমীকৰণটো স্থাপন কৰা।