

Total No. of printed pages = 23

3 (Sem-1) MAT-HG/RC-1

2019

MATHEMATICS

(Honours Generic/Regular)

Paper : MAT-HG-1016/MAT-RC-1016

Full Marks – 80

Time – Three hours

The figures in the margin indicate full marks
for the questions.

Answer either in English or in Assamese.

ইংৰাজী অথবা অসমীয়াত উত্তৰ কৰিব।

1. Answer the following questions : $1 \times 10 = 10$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়াঁ :

(a) Find the value of $\cos 1740^\circ$.

$\cos 1740^\circ$ ৰ মান উলিওঁৰা।

(b) Write the equation which shifted the graph
of the equation $x^2 + y^2 = 25$ into 3 units up
and 4 units left.

$x^2 + y^2 = 25$ সমীকৰণৰ লেখটোক 3 একক ওপৰৱলৈ
আৰু 4 একক বাওঁফালে স্থানান্তৰ কৰা সমীকৰণৰটো
উলিওঁৰা।

[Turn over

- (c) State whether the following statement is true or false :

"The domain of the function

$$f(x) = x^{\frac{1}{3}} \text{ is } (-\infty, \infty)$$

তলৰ উক্তিটো সচাঁ নে মিছা লিখা :

$$\text{"} f(x) = x^{\frac{1}{3}} \text{ ফলনটোৰ আদিকক্ষেত্ৰ } (-\infty, \infty) \text{"}$$

- (d) If $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2$, then find the value of

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{6 + f(x)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2 \text{ হলে } \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{6 + f(x)} - \text{ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।}$$

$$(e) \text{ If the function } f(x) = \begin{cases} 7x - 2, & x \leq 1 \\ kx^2, & x > 1 \end{cases}$$

is continuous everywhere then find the value of k.

$$f(x) = \begin{cases} 7x - 2, & x \leq 1 \\ kx^2, & x > 1 \end{cases} \text{ ফলনটো সদায়েই অবিচ্ছিন্ন}$$

হ'লে k-ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (f) What is the nth derivative of x^{n-1} ?

x^{n-1} ৰ nth অবকলজটো কি ?

- (g) Write the range of $\arctan x$.

$\arctan x$ -ৰ পৰিসৰ লিখা।

- (h) State Euler's theorem on homogeneous function.

সুষম ফলনৰ ইউলাৰৰ উপপাদ্যটোৰ উক্তি লিখা।

- (i) Write the Maclaurin series for e^x .

e^x ৰ মেক্লুৱিন শ্ৰেণীটো লিখা।

- (j) State whether the following statement is true or false :

"If $f'(x) = g'(x), \forall x \in (a, b)$ then $f - g$ is a constant function".

তলৰ উক্তিটো সচাঁ নে মিছা লিখা :

" $f'(x) = g'(x), \forall x \in (a, b)$ হ'লে $f - g$ এটা ধৰ্বক বাণি।"

2. Answer the following questions : $2 \times 5 = 10$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়াঁ :

(a) Draw the graph of $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

ফলনটোৰ লেখ আঁকা।

(b) Find the n th derivative of e^{ax} .

e^{ax} ৰ n তম অবকলজটো উলিওঁৰা।

(c) If $f'(x) = x(x-1)$, then on what interval the function f is decreasing ?

যদি $f'(x) = x(x-1)$ হয় তেন্তে কি অন্তৰালত f ফলনটো হ্রাসমান হব?

(d) Prove that $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

প্ৰমাণ কৰা যে $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

(e) If $v = x^2 + y^2 + z^2$, then prove that

$$x \frac{\partial v}{\partial x} + y \frac{\partial v}{\partial y} + z \frac{\partial v}{\partial z} = 2v.$$

যদি $v = x^2 + y^2 + z^2$ হয় তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে

$$x \frac{\partial v}{\partial x} + y \frac{\partial v}{\partial y} + z \frac{\partial v}{\partial z} = 2v.$$

3. Answer any four questions : $5 \times 4 = 20$

যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াঁ :

(a) For any angle θ , measured in radians, prove that

$$-|\theta| \leq \sin \theta \leq |\theta| \text{ and } -|\theta| \leq 1 - \cos \theta \leq |\theta|$$

θ ৰেডিয়ান জোখৰ যিকোনো কোণৰ বাবে প্ৰমাণ কৰা যে :

$$-|\theta| \leq \sin \theta \leq |\theta| \text{ আৰু } -|\theta| \leq 1 - \cos \theta \leq |\theta|$$

(b) Prove by analytical method $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিৰে প্ৰমাণ কৰা যে $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

(c) State and prove Rolle's theorem.

বলৰ উপপাদ্যটোৱ উকি লিখি প্ৰমাণ কৰা।

(d) If $y = e^{asin^{-1}x}$ then show that

$$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 + a^2)y_n = 0.$$

$y = e^{asin^{-1}x}$ হ'লে দেখুওৱা যে

$$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - (n^2 + a^2)y_n = 0.$$

(e) If three resistors R_1 , R_2 and R_3 are connected in parallel, the total resistance R is determined by the equation :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

(i) What is $\frac{\partial R}{\partial R_1}$?

(ii) Suppose that R_1 , R_2 and R_3 are variable resistors. How fast is R changing with respect to R_1 when $R_1=100$ ohms, $R_2=200$ ohms and $R_3=300$ ohms ?

সমান্তৰালভাৱে সংযোজিত তিনিটা ৰোধ R_1 , R_2 আৰু R_3 ৰ লক্ষ বল R এ তলৰ সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰে :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

(i) $\frac{\partial R}{\partial R_1}$ যে কি অর্থ প্ৰকাশ কৰে ?

(ii) যদি R_1 , R_2 আৰু R_3 তিনিটা চলমান ৰোধ হয়, তেন্তে R_1 সাপেক্ষে R ৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰা যেতিয়া $R_1=100$ ohms, $R_2=200$ ohms আৰু $R_3=300$ ohms.

(f) If $f(x, y) = \sqrt{y+1} + \log(x^2 - y)$ find $f(e, 0)$ and sketch the domain of f .

যদি $f(x, y) = \sqrt{y+1} + \log(x^2 - y)$ তেন্তে $f(e, 0)$ ৰ মান উলিওঁৰা। লগতে f ৰ আদিক্ষেত্ৰৰ নক্ষা তৈয়াৰ কৰা।

4. Answer either (a) and (b) or (c) and (d) :

(a) আৰু (b) বা (c) আৰু (d) অংশৰ উত্তৰ কৰা :

(a) Prove that

$$\cos(A - B) = \cos A \cdot \cos B - \sin A \cdot \sin B$$

Hence deduce that $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

5+1=6

প্রমাণ করা যে,

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B. \text{ ইয়াৰ}$$

$$\text{পৰা দেখুওৱা যে } \sin^2 A + \cos^2 A = 1.$$

- (b) In the triangle ABC, $a = 2$ units, $b = 3$ units and $\angle C = 60^\circ$. Find the value of $\sin B$.

ABC ত্রিভুজত $a = 2$ একক, $b = 3$ একক আৰু $\angle C = 60^\circ$. $\sin B$ ৰ মান উলিও়ৱা।

(c) Prove that $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + c.$

Hence find the value of $\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2}$
 $4+2=6$

প্রমাণ করা যে $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + c.$

ইয়াৰ পৰা $\int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2}$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (d) Consider the function $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$.
Find the function which :

- (i) shifts the graph of f three units up.
(ii) shifts the graph of f one unit to the left.

(iii) stretches the graph of f vertically by a factor 2.

(iv) compresses the graph of f horizontally by a factor 3.

$f(x) = 2x^2 + 3x + 4$ হ'লে, তলৰ ফলন কেইটা নিৰ্ণয় কৰা :

(i) f ফলনটোৰ লেখটোক তিনি একক ওপৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা।

(ii) f ফলনটোৰ লেখটোক এক একক বাঁওফালৈ স্থানান্তৰ কৰা।

(iii) f ফলনটোৰ লেখটোক দুই গুণ উলম্ব ভাৱে প্ৰসাৰিত কৰা।

(iv) f ফলনটোৰ লেখটোক তিনি গুণ আনুভূমিক ভাৱে সংকুচিত কৰা।

5. Answer any two of the following : $5 \times 2 = 10$
যিকোনো দুটা অংশৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) Evaluate any two :

$2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 5$

যিকোনো দুটাৰ মান নিৰ্ণয় কৰা :

(i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^6 + 5} - x^3 \right)$

(ii) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 - \tan x) \sec 2x$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{3x - 6}$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\cos cx}$$

- (b) If the function f is continuous everywhere, then find the values of the constants k and m . 5

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5 & , x > 2 \\ m(x+1) + k & , -1 < x \leq 2 \\ 2x^3 + x + 7 & , x \leq -1 \end{cases}$$

f ফলনটো সদায়েই অবিচ্ছিন্ন হ'লে k আৰু m ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5 & , x > 2 \\ m(x+1) + k & , -1 < x \leq 2 \\ 2x^3 + x + 7 & , x \leq -1 \end{cases}$$

- (c) Prove that $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}} = e$. 5

প্ৰমাণ কৰা যে $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}} = e$.

6. Sketch the level surfaces of

5+5=10

তলৰ ফলন কেইটাৰ পৃষ্ঠভৰ অংকন কৰা :

$$(i) f(x, y) = x^2 - y^2$$

$$(ii) f(x, y) = xy$$

Or/অথবা

- (a) State and prove Leibnitz theorem. 5

লীবনিতজ্জৰ উপপাদ্যটোৱ উক্তি লিখি প্ৰমাণ কৰা।

- (b) If $y = \tan^{-1} x$, then find y_n . 5

$y = \tan^{-1} x$ হ'লে y_n ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

7. If $u = \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{\frac{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3}}}$, then prove that

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\tan u}{12} \left(\frac{\tan^2 u + 13}{12} \right)$$

10

যদি $u = \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{\frac{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3}}}$ তাহলে প্রমাণ করা যে

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\tan u}{12} \left(\frac{\tan^2 u + 13}{12} \right)$$

Or/অথবা

State and prove the Mean value theorem. What is its physical interpretation? Verify Mean Value theorem for the function $f(x) = x^2 + 2x - 1$ in the interval $[0, 1]$. $1+4+2+3=10$

মধ্যমান উপপাদ্যটোর উক্তি লিখি প্রমাণ করা। ইয়াৰ ভৌতিক অর্থ কি? $f(x) = x^2 + 2x - 1$ ফলনটোৰ $[0, 1]$ অন্তৰালত উপপাদ্যটোৰ সত্ত্বা পৰীক্ষা কৰা।

MATHEMATICS

(Honours Generic)

Paper : MAT-HG-1026

Full Marks – 80

Time – Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Answer either in English or in Assamese.

ইংৰাজী অথবা অসমীয়াত উত্তৰ কৰিব।

1. Answer the following questions : $1 \times 10 = 10$

(i) What is the locus represented by the equation $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$?

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ সমীকৰণটোৱে কি সংগ্ৰহ পথ সূচায়?

(ii) Under what condition will the general equation

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ of the second degree represents a circle?

কি চৰ্তত $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ সাধাৰণ দিঘাত সমীকৰণটোৱে এটা বৃত্ত বুজাব?

- (iii) Express the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ in parametric form.

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ পরাবৃত্তটোক প্রাচলিক আকারত প্রকাশ করা।

- (iv) Find the eccentricity of the ellipse

$$x^2 + 3y^2 = a^2$$

$x^2 + 3y^2 = a^2$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রতা নির্ণয় করা।

- (v) Define conjugate diameters of a conic.

শাংকুর এটাৰ সংযুগ্ম ব্যাসৰ সংজ্ঞা দিয়া।

- (vi) Find the distance between the points $(2, 3, -1)$ and $(4, -1, 3)$

$(2, 3, -1)$ আৰু $(4, -1, 3)$ বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব নির্ণয় কৰা।

- (vii) If $\vec{a} = (-2, 0, 1)$ and $\vec{b} = (3, 5, -4)$, find $\vec{a} + \vec{b}$.

যদি $\vec{a} = (-2, 0, 1)$ আৰু $\vec{b} = (3, 5, -4)$ হয় তেন্তে, $\vec{a} + \vec{b}$ নির্ণয় কৰা।

- (viii) Find the unit vector that has the same direction as $\vec{a} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

$\vec{a} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ ৰ দিশত একক ভেস্টৰ নির্ণয় কৰা।

- (ix) Find the terminal point of $\vec{v} = (7, 6)$ if the initial point is $(2, -1)$.

$\vec{v} = (7, 6)$ ৰ প্রাঞ্চিবিন্দু নির্ণয় কৰা. যদি আদি বিন্দু $(2, -1)$ হয়।

- (x) What is the value of $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$?

$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$ ৰ মান কিমান?

2. Answer the following questions : $2 \times 5 = 10$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

- (i) Find the equation of the parabola whose focus is the point $(-1, 1)$ and directrix is the line $x+y+1=0$.

$(-1, 1)$ নাভিবিন্দু আৰু $x+y+1=0$ ৰেখা নিয়ামিকা হোৱা অধিবৃত্তৰ সমীকৰণ নির্ণয় কৰা।

- (ii) If the two pair of lines $x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ and $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ be such that each pair bisects the angle between the other pair, prove that $pq + 1 = 0$.

যদি $x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ আৰু $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ সৰলৰেখা দুয়োৰ প্রতি যোৰেই আনযোৰ মাজৰ কোণৰ সমদ্বিখণক হয়, প্ৰমাণ কৰা যে $pq + 1 = 0$.

- (iii) Find the centre and radius of the sphere $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 8z + 17 = 0$.

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 8z + 17 = 0$ সমীকৰণৰ গোলকটোৰ কেন্দ্ৰ আৰু ব্যাসার্দি নিৰ্ণয় কৰা।

- (iv) Find the norm of $\vec{a} = (-2, 3)$, $10\vec{b} = (-20, 30)$, $\vec{c} = (2, 3, 6)$.

$\vec{a} = (-2, 3)$, $10\vec{b} = (-20, 30)$, $\vec{c} = (2, 3, 6)$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (v) Find the angle between the vectors $\vec{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ and $\vec{b} = -3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

$\vec{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ আৰু $\vec{b} = -3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ ভেক্টুৰ মাজৰ কোণ নিৰ্ণয় কৰা।

3. Answer any four questions : $5 \times 4 = 20$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰ যিকোনো চাৰিটাৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) If by a rotation of the rectangular axes about the origin, the expression $ax^2 + 2hxy + by^2$ changes to $a'x'^2 + 2h'x'y' + b'y'^2$ then prove that $a + b = a' + b'$ and $ab - h^2 = a'b' - h'^2$.

আয়তীয় অক্ষদ্বয়ক মূলবিন্দু সাপেক্ষে ঘূৰালে যদি $ax^2 + 2hxy + by^2$ ৰাখিটো $a'x'^2 + 2h'x'y' + b'y'^2$ লৈ ৰূপান্তৰিত হয়, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে $a + b = a' + b'$ আৰু $ab - h^2 = a'b' - h'^2$.

- (b) Find the polar equation of the conic in the following form $\frac{1}{r} = 1 + e \cos \theta$.

তলত দিয়া আকাৰত শাংকৰৰ ধৰ্মীয় সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা : $\frac{1}{r} = 1 + e \cos \theta$.

- (c) By a suitable transformation remove the term containing xy from the equation

$$11x^2 + 4xy + 14y^2 = 5.$$

এটা যথোপযুক্ত ৰূপান্তৰৰ সহায়ত ১১ $x^2 + 4xy + 14y^2 = 5$ সমীকৰণটোৰ পৰা xy পদটো বিলোপ কৰা।

- (d) Calculate the scalar triple product $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ of the vectors $\vec{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, $\vec{v} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $\vec{w} = 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

$$\vec{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}, \vec{v} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \vec{w} = 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

ইলে $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ বা মান নির্ণয় করা।

- (e) If the equation

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ represents a pair of parallel straight lines, show that

$$\frac{a}{h} = \frac{b}{f} = \frac{g}{c}.$$

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ সমীকরণে এয়ের

সমান্তরাল সরলবেকাক বুজালে দেখুওৱা যে $\frac{a}{h} = \frac{b}{f} = \frac{g}{c}$.

- (f) Find the condition that the line $lx+my+n=0$ is a tangent to the conic

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$lx+my+n=0$ সরলবেকাল, $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ শাকৰ স্পর্শক হোৱাৰ চৰ্ত উলিওৱা।

4. Answer any four questions : $10 \times 4 = 40$

তলৰ যিকোনো চাৰিটাৰ উভৰ কৰা :

- (a) (i) Prove that, $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$.

প্ৰমাণ কৰা যে, $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$.

- (ii) Find the parametric equations of the line L passing through the points P(2, 4, -1) and Q(5, 0, 7).

P(2, 4, -1) আৰু Q(5, 0, 7) বিন্দু মাজেৰে যোৱা L ৰেখাডালৰ প্ৰাচলিক সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) (i) Show that the direction cosines of a vector satisfy

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

দেখুওৱা যে এটা ভেক্টৰৰ দিশাংকই $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ সিদ্ধ কৰে।

- (ii) Find parametric equations describing the line segment joining the points P(2, 4, -1) and Q(5, 0, 7)

P(2, 4, -1) আৰু Q(5, 0, 7) বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰাচলিক সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

(c) (i) Reduce the equation :

$x^2 + 4xy + y^2 - 2x + 2y + 6 = 0$ to the standard form.

$x^2 + 4xy + y^2 - 2x + 2y + 6 = 0$ সমীকরণটোর
মান আকারলৈ লয়ুকৰণ কৰা।

(ii) Find the pole of the line $lx+my+n=0$
with respect to the parabola $y^2=4ax$.

$y^2=4ax$ অধিবৃত্তৰ সাপেক্ষে $lx+my+n=0$
বেখাৰ ধন্ব বিন্দু নিৰ্কপণ কৰা।

(d) (i) Prove that the equation of the chord of contact of tangent drawn from (x_1, y_1)

to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1.$$

প্ৰমাণ কৰা যে $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ হ'ল, (x_1, y_1)

বিন্দুৰ পৰা $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শবোৰৰ
ছেদবিন্দুত টনা জ্যাৰ সমীকৰণ।

(ii) Find the equation of the tangent to the conic

$4x^2 + 3xy + 2y^2 - 3x + 5y + 7 = 0$ at the
point $(1, -2)$

$(1, -2)$ বিন্দুত $4x^2 + 3xy + 2y^2 - 3x + 5y + 7 = 0$ শাখকৰ ওপৰত টনা স্পৰ্শকৰ সমীকৰণ
নিৰ্ণয় কৰা।

(e) (i) Prove that the eccentric angles of the
extremities of two conjugate semi-
diameters of an ellipse differ by a right
angle.

প্ৰমাণ কৰা যে এটা উপবৃত্তৰ দুড়াল অনুবন্ধী
অৰ্ধব্যাসৰ প্রান্তবিন্দুৰ উৎকেন্দ্ৰিক কোণৰ পাৰ্থক্য
এক সমকোণ।

(ii) If the polars of (x_1, y_1) and (x_2, y_2) with
respect to $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ are at right angles,
then show that $b^4 x_1 x_2 + a^4 y_1 y_2 = 0$.

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ পৰাবৃত্ত সাপেক্ষে (x_1, y_1) আৰু
 (x_2, y_2) বিন্দুৰ ধনীয় বেখা দুড়াল লম্বমান হ'লৈ
দেখুওৱা যে $b^4 x_1 x_2 + a^4 y_1 y_2 = 0$.

(f) (i) Show that the equation

$2x^2 + 7xy + 3y^2 + 8x + 14y + 8 = 0$ represents two straight lines and find the angle between them.

$2x^2 + 7xy + 3y^2 + 8x + 14y + 8 = 0$ সমীকরণে
এয়ের সরলরেখাক নির্দেশ করে। রেখা দুড়ালৰ
মাজৰ কোণটো নির্ণয় কৰা।

(ii) If the line $3x - 2y = 18$ be a tangent to the circle $x^2 + y^2 + 5x + 6y - 14 = 0$ find the point of contact.

যদি $3x - 2y = 18$ রেখাডাল $x^2 + y^2 + 5x + 6y - 14 = 0$ বৃত্তৰ এডাল স্পর্শক, স্পর্শবিন্দুটো নির্ণয় কৰা।

(g) (a) (i) Show that $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ is a tangent line to the hyperbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ if}$$

$$p^2 = a^2 \cos^2 \alpha - b^2 \sin^2 \alpha.$$

দেখুওৱা যে $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ পৰাবৃত্ত

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ বৰ স্পৰ্শক হব যদি}$$

$$p^2 = a^2 \cos^2 \alpha - b^2 \sin^2 \alpha.$$

(ii) Find the asymptotes of the hyperbola

$$2x^2 - xy - y^2 + 2x - 2y + 2 = 0$$

$2x^2 - xy - y^2 + 2x - 2y + 2 = 0$ পৰাবৃত্তটোৰ অন্তস্পর্শী
ৰেখাদ্বয় নির্ণয় কৰা।

(b) (i) Find the equation of the pair of tangents drawn from a point (x_1, y_1) not on the conic $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ to the given conic.

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ শাংকৰৰ
ওপৰত নথকা (x_1, y_1) বিন্দুৰ পৰা শাংকৰটোলৈ
তনা স্পৰ্শকদ্বয়ৰ সমীকৰণ নির্ণয় কৰা।

(ii) Find the lengths of the semiaxes of the conic $7x^2 + 52xy - 32y^2 = 180$.

$7x^2 + 52xy - 32y^2 = 180$ শাংকৰৰ ধৰ্মীয় সমীকৰণ
নির্ণয় কৰা।